

# Gavilán rastrero

*Circus hudsonius*



## Identificación

El gavilán rastrero o sea aguilucho nortero es una rapaz que anida en el suelo y mide entre 41 y 52 cm de largo. Los machos y las hembras son dimórficos, lo que significa que parecen diferentes; los machos son grises mientras que las hembras son marrones. Ambos tienen una mancha blanca en la base de la cola, que se nota fácilmente en vuelo. Son distintivos a la distancia: un halcón delgado de cola larga que vuela deslizándose o volando bajo sobre un pantano o pradera, sosteniendo sus alas en forma de V.



Fotografía por: [Tom Koerner USFWS/Flickr](#)

## Consejos de observación


El gavilán rastrero es un halcón común y se puede ver durante todo el año en gran parte de la mitad norte de los Estados Unidos, reproduciéndose en Canadá e invernando en el sur de los Estados Unidos, en México y el norte de América del Sur. Llegan a las zonas de reproducción desde finales de marzo hasta principios de abril y anidan hasta julio. Suelen migrar hacia el sur de agosto a noviembre. Son más notables en vuelo. Tenga en cuenta el estilo de vuelo bajo y lento, la postura del ala en forma de V del pájaro y su rabadilla blanca.

## Dato interesante

Los aguiluchos norteros son los halcones más parecidos a los búhos, aunque no están relacionados con los búhos. La cara en forma de disco se ve y funciona de manera muy parecida a la de un búho, con plumas faciales rígidas que ayudan a dirigir el sonido a los oídos. Dependen de la audición y la visión para capturar a sus presas, y su cara de búho lo ayuda a escuchar ratones y topillos debajo de la vegetación.

## Hábitat ideal

Los gavilanes rastreros viven en pastizales, pantanos o campos abiertos, prefiriendo hábitats relativamente abiertos caracterizados por una vegetación alta y densa (> 24 pulgadas / 60 cm). Utilizan vegetación nativa o cultivada en pastizales húmedos o secos, humedales frescos a alcalinos, pastos ligeramente pastoreados, campos en barbecho o viejos y áreas con matorrales con poco terreno desnudo (<10%) y algunos arbustos (> 30%). La mayoría de los nidos se encuentran en humedales no perturbados o en pastizales dominados por una espesa vegetación. Los nidos están en el suelo y generalmente en un grupo denso de vegetación como sauces, pastos, juncos, espadañas, y totoras.



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Como el gavilán rastrero anida en el suelo, el manejo que beneficia a la especie es similar al manejo de los pájaros cantores o aves de caza de los pastizales. Retrase el pastoreo durante la primavera en algunas áreas, para que haya vegetación más alta disponible durante la temporada de reproducción y anidación. Mantenga grandes áreas de pradera intacta con algunos arbustos. La tierra inscrita en el Conservation Reserve Program (CRP) y plantada con diversas especies nativas de praderas puede proporcionar un hábitat adecuado. En la región de las praderas de pastos altos, se recomienda quemar o cortar el césped cada 3-5 años para mantener el hábitat de las pequeñas presas de los roedores. Debido a que los nidos a menudo se construyen cerca de los humedales, mantenga estas áreas húmedas en condiciones naturales, especialmente los humedales de al menos 20 acres / 8 ha de tamaño. Los gavilanes rastreros se alimentan en

áreas perturbadas donde la presa es más visible, por lo que las condiciones heterogéneas creadas a través del pastoreo rotacional pueden proporcionar un buen ambiente para los gavilanes.

## Actividades de manejo que deben evitarse

Evite perturbaciones como quemar, segar heno, cosechar semillas y cortar el césped antes y durante el período de anidación (abril a julio). Evite el pastoreo intensivo y la quema o corte frecuente en las áreas de reproducción para proporcionar una densa cobertura de vegetación en la primavera. Evite drenar y remover humedales.

## Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat del gavilán rastrero son las aguilillas reales, las aguilillas de Swainson, los praderos del oeste y los gorriones alas blancas.

## Otros recursos

**BirdLife International y Manual de las aves del mundo.** 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Gavilán rastrero](#)

**NatureServe,** 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Gavilán rastrero](#)

**The Cornell Lab of Ornithology** [Birds of the World \(Gavilán rastrero\)](#)

**The Cornell Lab of Ornithology,** [Todo sobre las aves \(Gavilán rastrero\)](#)

Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, MP Nenneman y BR Euliss. 1998 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en las aves de los pastizales: Gavilán rastrero](#). Centro de Investigación de Vida Silvestre de Northern Prairie, Jamestown, Dakota del Norte. 15 páginas.