

# Escribano collar castaño



*Calcarius ornatus*

## Identificación

Los escribanos collar castaño miden 4.5-6 en/11-15 cm de largo. Son una de las aves más coloridas de la pradera de pasto corto; los machos tienen el vientre negro, la garganta amarillenta y la nuca oxidada. Las hembras y las aves no reproductoras son menos llamativas, en su mayoría de color marrón grisáceo pálido en la parte superior con rayas borrosas en el pecho. La cola es distintiva en todas las aves, en su mayoría blanca con un triángulo negro en el centro.



Fotografía: Macho ([Rick Bohn, USFWS/Flickr](#))

## Consejos de observación

En la primavera, los machos vuelan hacia arriba en una exhibición aérea, extendiendo sus colas y cantando en el camino hacia abajo. Los machos también se posarán en un poste de cerca o arbusto para cantar un dulce gorjeo, que suena similar a un pradero del oeste. Los escribanos collar castaño caminan o corren por el suelo y mueven la cabeza mientras se alimentan. Los machos cantan en perchas expuestas, como cercas de alambre de púas, durante la primavera y el verano. Durante la migración y el invierno, a menudo forman bandadas de hasta 100 individuos. Durante la

temporada de cría, los escribanos se pueden encontrar en las Grandes Llanuras del Norte, mientras que en el invierno, se pueden encontrar en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México.


## Dato interesante

Estas aves derivan su nombre en inglés ("longspur" significa "espolón largo") de su color y la garra alargada del dedo del pie que mira hacia atrás. A diferencia de muchos pájaros cantores que viven en los bosques, los escribanos collar castaño y otras aves de los pastizales no saltan sobre el suelo, sino que caminan o corren.

## Hábitat ideal

Los escribanos collar castaño prefieren praderas de pasto corto o pasto mixto con algo de tierra desnuda y licopodios, y pocos o ningún arbusto (<10%). En áreas secas con escasa vegetación, buscan prados húmedos y otras áreas bajas y húmedas donde la vegetación es más alta y densa. Prefieren una mezcla de pastos cortos y altos, especialmente pastos de racimo, y generalmente evitan la cobertura alta y densa que es común en algunas tierras del Conservation Reserve Program (CRP). Anidarán en campos de heno cortados y pastos de pastoreo, siempre que la vegetación tenga entre 20 y 30 cm de altura, pero generalmente evitan anidar en campos cultivados. Prefieren los pastos nativos a los pastos plantados o los campos de heno, y evitan las áreas con basura densa (~ 15% del suelo desnudo). Un territorio de reproducción generalmente se centra en

una gran roca, poste de cerca o arbusto, que se usa como percha para cantar. Algunas investigaciones han demostrado que anidan con mayor éxito en parches de pastizales > 140 ac/56 ha de tamaño.



## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Debido a que los escribanos collar castaño se reproducen en una región históricamente perturbada por el fuego y los grandes herbívoros, las aves generalmente prefieren las áreas perturbadas por el pastoreo, la quema y la siega, ya que mantiene la altura de vegetación preferida y diversidad. Permita niveles moderados de pastoreo en praderas de pasto mixto, dejando algunas áreas de vegetación de al menos 6 pulgadas / 15 cm de altura. Utilice un sistema de rotación doble, que crea un hábitat más adecuado que el pastoreo de corta o larga temporada. Evite el pastoreo excesivo en las praderas de pastos cortos, especialmente en áreas de escasas precipitaciones. La siega puede mejorar el hábitat de los escribanos collar castaño en áreas húmedas

Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

de pasto mixto al disminuir la altura y la densidad de la vegetación, aunque las áreas de pastoreo generalmente se prefieren a las áreas segadas. Retrase la siega hasta mediados de julio, cuando las aves jóvenes deberían estar fuera de sus nidos. Utilice una barra para huir a los pájaros o un dispositivo similar si hay que cortar el césped antes de mediados de julio. Realice las quemas prescritas a fines del verano o principios del otoño para controlar la densidad de los arbustos, especialmente en áreas que históricamente se quemaron y el fuego ha sido suprimido, como la pradera de pasto mixto.

## Actividades de manejo que se deben evitar

Mantenga áreas más grandes de pradera nativa minimizando la conversión de pastizales para cultivos. Evite sembrar campos con pastos exóticos más altos como el tigrillo ruso del norte. Evite el desarrollo de carreteras y energía a través de áreas conocidas de anidación de escribanos, ya que la perturbación puede hacer que las aves abandonen el área. Evite los pesticidas si es posible, ya que los productos químicos pueden dañar a los adultos y los polluelos y reducir las fuentes de alimento de los insectos.

## Otras especies que se benefician de un manejo de hábitat similar

Otras especies que pueden beneficiarse del manejo de hábitat para el escribano collar castaño incluyen camaleón de montaña de cuernos cortos, gorriones alas blancas, praderos del oeste y zorros veloces.

## Otros recursos

**BirdLife International y Manual de las aves del mundo.** 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Escribano collar castaño](#)

**Bird Conservancy of the Rockies.** 2018. [Compartiendo su tierra con las aves de las praderas del norte: una guía para el administrador de la tierra.](#) Brighton, CO. 49 págs.

**The Cornell Lab of Ornithology.** Todo sobre las aves ([Escribano collar castaño](#)).

**Sedgwick, JA 2004.** Servicio Forestal del USDA, Región de las Montañas Rocosas. [Escribano collar castaño \(Calcarius ornatus\): una evaluación técnica de conservación.](#)