

Lagarto de collar de la Gran Cuenca



Crotaphytus bicinctores

Identificación

El lagarto de collar de la Gran Cuenca, también llamado lagarto de cuello negro de Mojave o largato de collar del desierto, mide entre 6 y 11 cm de largo con una cabeza blanca grande, ancha, con manchas marrones y una cola larga. Tiene dos collares negros distintos separados por una banda blanca alrededor de su cuello y en su mayoría las partes inferiores del cuerpo son blancas. Sus espaldas son de color marrón claro a gris o marrón rojizo con bandas transversales más claras y difusas. Los machos adultos son verdes, marrones u oliva con muchas manchas blancas, mientras que las hembras son menos coloridas. Sus patas tienen manchas amarillas y las patas traseras son relativamente grandes.



Fotografía por: [Tom Benson](#)/Flickr

Consejos de observación

El lagarto de collar de la Gran Cuenca se encuentra en las regiones áridas y semiáridas de Mojave, Sonora y el sureste de la Gran Cuenca dentro de los Estados Unidos. Durante la temporada de invierno, el lagarto de collar está inactivo. Durante los meses activos, estos lagartos pasan la mayor parte de su tiempo en áreas rocosas en busca de sombra y protección de los depredadores. Son activos durante el día y muy tolerantes al calor. Es probable que se los vea tomando el sol encima de pequeñas rocas.

Dato interesante

Los lagartos de collar son una de los únicos lagartos que pueden correr usando solo sus patas traseras. Son rápidos con pasos largos de hasta tres veces la longitud de su cuerpo.

Hábitat ideal

Los lagartos de collar de la Gran Cuenca viven en áreas secas y rocosas con escasa vegetación, bosques de enebro y hábitats de matorrales de artemisa. Se encuentran en áreas rocosas y montañosas dentro de la Gran Cuenca. Los lagartos de collar de la Gran Cuenca generalmente están restringidos a áreas con pendientes rocosas, barrancos, cañones y montones de rocas (> 20% de fragmentos de roca). Se esconden debajo de rocas y en madrigueras de roedores. Estos lagartos comen pequeños vertebrados e invertebrados.



Mapa del hábitat proporcionado por International Union for Conservation of Nature

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Mantenga áreas rocosas dentro de matorrales de artemisa y desiertos en el hábitat de los lagartos de collar de la Gran Cuenca. El pastoreo de ganado bien administrado es compatible con las necesidades del hábitat de los lagartos, ya que no requieren una cubierta vegetal específica. Con el fin de proporcionar un hábitat apropiado para sus presas, las especies invasoras deben manejarse utilizando un enfoque integrado.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite recolectar o permitir la recolección de lagartos de collar de la Gran Cuenca. Si ve un lagarto de collar de la Gran Cuenca, evite recogerlo. Evite el uso extensivo de vehículos todoterreno en

el hábitat de los lagartos de collar de la Gran Cuenca, ya que pasan tiempo tomando el sol en las rocas al aire libre.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otras especies de lagartos y especies del desierto, incluidos sus depredadores, alcaudón americano, aguilillas y chirrioneras, se beneficiarán del manejo del hábitat para los lagartos de collar de la Gran Cuenca.

Otros recursos

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California. Cuenta de la historia de vida del Lagarto de Collar de la Gran Cuenca

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2014. Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. Versión 2021-1 [Lagarto de Collar de la Gran Cuenca](#)

NatureServe, 2019. NatureServe Explorer: Una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Lagarto de collar de la gran cuenca](#)