

# Sabanero de Henslow



*Centronyx henslowii*

## Identificación

El sabanero o gorrión de Henslow es un pequeño pájaro de pradera de 5 pulgadas/13 cm de largo, aproximadamente del tamaño de un gorrión común. Tienen una cabeza grande y plana con un pico grande y pesado y una cola corta y puntiaguda; en general oscuro, con verde oliva a oliva-anteojo en la cabeza; estrechas rayas negruzcas en el pecho y los flancos beige, el resto de las partes inferiores blanquecinas.



Fotografía por: [Kenneth Cole Schneider](#) /Flickr

## Consejos de observación

La migración comienza a principios de marzo y la mayor parte de la migración se realiza en abril. El inicio de la migración otoñal no se comprende bien. El canto tiende a disminuir en septiembre, por lo que se supone que está migrando. Son reservados por su naturaleza y no aparecen fácilmente. A menudo prefieren correr bajo la hierba o la cubierta de maleza y, si se enrojecen, solo entonces vuelan en un recorrido corto en zigzag antes de volver a caer abruptamente en la hierba. Se ve más fácilmente cuando el macho canta desde perchas expuestas en los campos durante la

temporada de reproducción. El gorrión de Henslow a menudo es difícil de detectar porque canta desde perchas discretas en hierbas bajas, arbustos o pastos. Incluso cuando canta, es fácil no notar la llamada seca, delgada y corta de este gorrión.


## Dato interesante

El sabanero de Henslow tiene el canto más simple y corto de todos los pájaros cantores de América del Norte, un canto delgado parecido al de un insecto, descrito con precisión como un "hipo débil".

## Hábitat ideal

Una vez común en las praderas de pastos altos del Medio Oeste y los pastizales húmedos del este de América del Norte, el sabanero de Henslow es un ave de pastizal notablemente discreta. Prefiere hábitats con vegetación alta (2-4 pies/0.6-1.2 m), densa y hojarasca espesa (<2% de suelo desnudo), con pocos arbustos o árboles (<5%). El gorrión chapulín similar (*Ammodramus savannarum*) y gorrión sabanero extendido (*Passerculus sandwichensis*) suelen seleccionar sitios más secos con vegetación más corta y menos densa. Aunque los territorios individuales son pequeños, 0.45-2.0 ac/0.18-1.0 ha, el tamaño del parche de pastizales es un componente importante del hábitat del gorrión de Henslow. Es más probable encontrar gorriónes de Henslow, y las densidades pueden ser más altas, en áreas de pastizales grandes, 75-135 ac/30-55 ha, que en

áreas pequeñas. El sabanero de Henslow puede ocupar tierras agrícolas como un campo de heno y pastizales ociosos siempre que la vegetación sea densa y alta con abundante basura.



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Mantener parches de pastizales intactos de al menos 75 acres/30 ha de tamaño. El pastoreo de densidad de población de leve a moderada puede ser beneficioso para mantener el hábitat general del sabanero de Henslow. Asegúrese de que algunas áreas tengan pastos de al menos 12 pulgadas/30 cm de altura en la primavera para anidar gorriones. Reduzca la invasión de arbustos y árboles mediante el uso de fuego cada 2 a 4 años. Al dejar al menos 2 años entre quemaduras, la acumulación de escombros es adecuada para el hábitat del gorrión de Henslow.

## Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la conversión de praderas nativas de pastos altos y pastizales húmedos en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Evite la quema anual ya que esto eliminará la acumulación de escombros. Evite cortar el césped hasta después de anidar cuando sea posible (finales de julio).

## Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otros animales salvajes que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el sabanero de Henslow incluyen el gorrión de LeConte y el gavián rastrero.

## Otros recursos

**BirdLife International y Manual de las aves del mundo.** 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Sabanero de Henslow](#)

**The Cornell Lab of Ornithology.** [Las aves del mundo \(sabanero de Henslow\)](#)

**The Cornell Lab of Ornithology.** [Todo sobre las aves \(gorrión de Henslow\).](#)

**NatureServe.** 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Sabanero de Henslow](#)

**Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, PA Rabie y BR Euliss.** 1999 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en aves de pastizales: Gorrión de Henslow.](#) Centro de Investigación de Vida Silvestre de Northern Prairie, Jamestown, Dakota del Norte. 33 páginas.