

Búho cuerno corto o búho sabanero



Asio flammeus

Identificación

El búho cuerno corto (también conocidos como búho sabanero o tōlchīcuahtli) es uno de los búhos más comunes en el mundo y tiene aproximadamente el tamaño de un cuervo, de 13 a 16 pulgadas/34 a 43 cm de largo. Los “cuernos” mencionados en su nombre son difíciles de ver. Las alas son anchas y las puntas suavemente redondeadas, y la cola es corta. Tiene un estampado bastante uniforme, con rayas marrones y blancas en todas partes y un blanco sólido debajo del ala, visto durante el vuelo. El rostro es pálido con ojos amarillos acentuados por contornos negros.



Fotografía por: [Joe M. Devereux](#)/Flickr

Consejos de observación

Los búhos cuerno corto cazan durante el día, a diferencia de la mayoría de los búhos. También se les considera un migrante parcial. En América del Norte, muchas aves se reproducen en Canadá, Nueva Inglaterra e invernan en el sur de los Estados Unidos. Llegan a sus áreas de reproducción en abril en el extremo norte y se dirigen hacia el sur hasta noviembre donde pasan el invierno. Como la mayoría de las aves rapaces, suelen tener un nido con huevos en marzo. También hay aves residentes en el norte del Medio Oeste / Oeste, que se pueden ver durante todo el año. Busque estas aves en pastizales y áreas abiertas, donde se posan en árboles bajos o en el suelo. Las poblaciones fluctúan anualmente según la variación en las poblaciones de pequeños mamíferos.


Dato interesante

Los búhos sabaneros pueden viajar largas distancias sobre vastas extensiones de océano. Testigos han informado haber visto a estos búhos descender en barcos a cientos de millas de tierra.

Hábitat ideal

Los búhos cuerno corto habitan una variedad de extensiones abiertas de praderas y otros hábitats de pastizales junto con estepas arbustivas, tundra y áreas agrícolas. También se ven en latitudes árticas altas a medias y en islas cercanas a la costa. En las Grandes Llanuras, prefieren anidar dentro de grandes parches de pastizales con cobertura herbácea relativamente alto, 12-24 pulgadas/30-60 cm, y denso, 30-50% con un

componente arbustivo bajo, <5%. Hacen sus nidos en el suelo, con el cuenco del nido raspado por la hembra y cubierto de hierba.



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

En áreas de pastos altos, se recomienda quemar o cortar el césped cada 3-5 años para mantener el hábitat de los topillos, la principal presa de pequeños roedores de los búhos cuerno corto. Trabaje con los defensores de la ganadería y la agricultura para mantener los pastos y pastizales nativos. Mantenga un mosaico de pastizales y humedales para que algunas unidades estén disponibles para anidar. Para evitar la muerte o lesiones por colisiones con cercas, retire las cercas que no se utilizan. Aumente la visibilidad de las cercas colgando [marcadores de cerca](#), como los que se usan para el urogallo de las artemisas.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la conversión de pastizales nativos en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Evite cazar mamíferos con balas de plomo, porque los búhos son susceptibles a una intoxicación secundaria por comer mamíferos matados con balas de plomo. Del mismo modo, evite envenenar a los pequeños mamíferos que también pueden tener una consecuencia secundaria negativa para los búhos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el búho sabanero son el antílope berrendo, el gavián rastrero, el gorrión alas blancas, el gorrión chapulín y el pradero del oeste.

Otros recursos

BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Búho sabanero](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Birds of the World \(Búho cuerno corto\)](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Todo sobre las aves \(Búho sabanero\)](#)

NatureServe. 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Búho sabanero](#)

Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, PA Rabie y BR Euliss. 1999 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en las aves de los pastizales: Búho cuerno corto](#) Centro de Investigación de Vida Silvestre de Northern Prairie, Jamestown, Dakota del Norte. 33 páginas.