

Aguililla de Swainson

Buteo swainsoni

Identificación

Las aguilillas de Swainson son grandes rapaces, un poco más pequeñas que un ganso y miden entre 18.9 y 22.1 pulgadas/48-56 cm de largo. Se notan más por su pechera o pecho rojizo y vientre blanco, y partes superiores marrones o grises, aunque pueden ser bastante variables. Las aguilillas de Swainson tienen alas inferiores distintivas con revestimientos blancos (borde frontal) en las alas que contrastan fuertemente con las plumas de vuelo negruzcas (bordes externos y posteriores). La mayoría de los machos tienen la cabeza gris; las hembras tienden a tener cabezas marrones. También se presentan individuos de morfo oscuro que varían entre un cuerpo completamente rojizo hasta casi todo negro.



Consejos de observación

Las aguilillas de Swainson se encuentran reproduciéndose en todo el medio oeste-oeste y el norte hacia el oeste de Canadá. Casi toda la población reproductora migra cada otoño desde América del Norte a áreas de invernada en el sur de América del Sur. Desde las praderas de Canadá, esta migración es de más de 10,000 km en cada dirección. Anidan en árboles solitarios en la pradera y más cerca de las áreas ribereñas. Busque "kettles" en el cielo, o una bandada de

aguilillas volando juntos. Pueden ahorrar la energía de su cuerpo moviéndose de térmica a térmica en el cielo durante su larga migración.


Dato interesante

Una especie muy gregaria, la aguililla de Swainson se alimenta y migra en bandadas que a veces se cuentan por miles. Su movimiento a través de América Central ha sido descrito como "una de las reuniones de aves más impresionantes de América del Norte, desde la desaparición de la paloma migratoria". Se han contado casi 350.000 aguilillas de Swainson pasando por un solo punto en la ciudad de Panamá en octubre y noviembre, y se han contado hasta 845.000 en un solo otoño en Veracruz, México.

Hábitat ideal

La aguililla de Swainson prefiere el hábitat nativo histórico y existente, y busca alimento en rodales abiertos de vegetación dominada por pastos (> 50% de cobertura herbácea), matorrales dispersos (<10% de cobertura de arbustos) y algunos bosques abiertos y pequeños. Se ha adaptado bien a las áreas agrícolas (por ejemplo, trigo y alfalfa), pero no puede alimentarse en la mayoría de los cultivos anuales o perennes que crecen mucho

más que los pastos nativos, lo que dificulta la búsqueda de presas. Anidan en árboles solitarios o en grupos de árboles, a menudo cerca de un arroyo o área ribereña, y ocasionalmente en plataformas de nidos artificiales o en el suelo. La altura de los árboles es importante para el éxito del nido, pero puede variar mucho, de 6 a 40 pies/2 a 12 m de altura.



Mapa del hábitat proporcionado por: BirdLife International

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Las aguilillas de Swainson son tolerantes con las áreas cultivadas y otras áreas inducidas por el hombre, así como con el hábitat de pastizales abiertos con algunos árboles. Deje los árboles tanto como sea posible, ya que estas aguilillas anidan en árboles solitarios y cortavientos. Debido a que los cortavientos pueden disuadir a muchos pájaros cantores de los pastizales de ocupar los pastizales y fragmentar su hábitat, considere los cortavientos solo cerca de cercas y estructuras si es posible.

Solicite a las compañías eléctricas locales que adapten los postes / líneas eléctricas en áreas con ubicaciones conocidas de aguilillas para evitar la electrocución.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la conversión de praderas nativas en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Evite cazar mamíferos con balas de plomo, porque las aguilillas son susceptibles a una intoxicación secundaria por comer mamíferos matados con balas de plomo. Del mismo modo, evite envenenar a los pequeños mamíferos que también pueden tener un daño secundario negativo para las aguilillas. Evite quitar árboles viejos o todos los árboles de un área.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat de la aguililla de Swainson son las aguilillas reales, las alondras cornudas, los praderos del oeste y el antílope berrendo.

Otros recursos

BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Aguililla de Swainson](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Todo sobre las aves \(Aguililla de Swainson\).](#)

NatureServe. 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Aguililla de Swainson](#)

Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, PA Rabie y BR Euliss. 1999 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en aves de pastizales: Aguililla de Swainson.](#) Centro de Investigación de Vida Silvestre de Northern Prairie, Jamestown, Dakota del Norte. 33 páginas.