

Escribano de McCown

Rhynchophanes mccownii



Identificación

El escribano de McCown o arnoldo de McCown tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de un mirlo primavera con una altura de 5-6 pulgadas/12-15 cm. El macho tiene la cara gris con la corona y el "bigote" negros, la espalda gris con rayas negras, la garganta blanca, el pecho negro y el vientre blanco. Los hombros de color castaño se notan especialmente en vuelo. Se puede ver una "T" invertida en la cola en vuelo, formada por una banda negra en el extremo de la cola, plumas negras centrales de la cola y plumas exteriores blancas de la cola. La hembra es similar al macho, pero los colores son apagados. El canto aéreo del macho consiste en un gorjeo tintineante, más complejo que cuando está posado.



Fotografía por: Erin Youngberg/Bird Conservancy of the Rockies

Consejos de observación

Los escribanos de McCown llegan a sus zonas de reproducción en la franja noroeste de las Grandes Llanuras y el extremo sur de las Provincias de las Praderas Canadienses en abril. Establecen territorios usando una exhibición aérea donde el macho aletea hacia arriba a una altura de aproximadamente 32 pies/10 m y luego desciende con las alas extendidas retenidas para mostrar el forro blanco vivo, con su cola estampada en forma de una "T" blanca y negra, en forma de abanico, y emite una canción tintineante y gorjeante. A menudo se encuentran en pastos de pastoreo, pero se pueden ver en pueblos de perros de la pradera o tierras de cultivo aradas.


Dato interesante

Los nidos en el suelo son difíciles de encontrar para los depredadores (y los humanos) porque la hembra se sienta firmemente en su nido hasta que prácticamente la pisa, confiando en su camuflaje para evitar ser detectada. Las hembras también tienen un fuerte instinto para proteger los huevos. Un investigador que quería contar los huevos en el nido de una madre particularmente protectora tuvo que levantarla primero del nido porque se negó a abandonar sus huevos ni siquiera momentáneamente.

Hábitat ideal

Los escribanos de McCown están restringidos a un área de distribución limitada dentro de las Grandes Llanuras y se consideran especialistas en hábitats. Ocupan hábitats abiertos con vegetación escasa, como praderas de pastos cortos, pastos de pastoreo intensivo, campos arados y lechos de lagos secos (playas), con

una altura de vegetación de 3 pulgadas/7,6 cm o menos. Los hábitats comunes incluyen praderas, desiertos, tundra, playas, dunas y pastos densamente pastoreados. Los nidos tienden a estar orientados hacia el norte, y muchos de los nidos se colocan cerca de matas de hierba, arbustos, nopal peladito (*Opuntia polyacantha*) o estiércol de vaca. Los territorios de anidación suelen incluir un 45–80% de cobertura herbácea y un 15–25% de suelo desnudo, con poca o ninguna cobertura de herbáceas, plantas leñosas o cactus, excepto por la ubicación del nido cerca de una estructura más alta (<10% de arbustos) para protegerse del sol.



Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Cuando sea apropiado, maneje para praderas nativas de pasto corto de navajita y gramilla de San Agustín. Debido a que los escribanos de McCown requieren pasto muy corto y algo de terreno desnudo para anidar, pastan al final de la temporada de crecimiento y en la temporada de no crecimiento (desde finales del verano hasta el invierno), y también pastan más en los años húmedos y moderadamente en los años secos. Queme la pradera de pasto corto fuera de la temporada de anidación para crear condiciones de vegetación favorables. El heno anual a finales del verano puede crear un hábitat de reproducción adecuado para el año siguiente.

Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la conversión de praderas nativas de pasto corto y pasto mixto en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Si se necesita el control de la población de perritos llaneros, elija un enfoque de manejo integrado de plagas que cumpla con los objetivos sin eliminar toda la colonia o dañar a otras especies. Si el control de los perritos llaneros requiere el uso de productos químicos, envenene solo las madrigueras activas. Evite el uso de pesticidas en cultivos cuando sea posible. Evite descansar durante más de un año en áreas extensas donde anidan los escribanos de McCown.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los escribanos de McCown son los chorlos llaneros, los tecolotes llaneros, las alondras cornudas y los antílopes berrendos.

Otros recursos

BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Escribano de McCown](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Todo sobre las aves \(Escribano de McCown\)](#)

NatureServe. 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Escribano de McCown](#)

Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, PA Rabie y BR Euliss. 1999 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en las aves de los pastizales: Escribano de McCown](#) Centro de Investigación de Vida Silvestre de Northern Prairie, Jamestown, Dakota del Norte. 33 páginas.