

# Chingolo de Bachman



*Peucaea aestivalis*

## Identificación

El chingolo de Bachman, también conocido como sabanero cabecilistado o zacatonero de Bachman, mide aproximadamente 15 cm/6 pulgadas de largo y pesa 20 g/0,7 oz. Su espalda es de color marrón grisáceo con un vientre de color ligeramente más claro. Esta pequeña ave es tímida y depende de un hábitat herboso para cubrirse mientras busca semillas de césped e insectos como saltamontes, escarabajos y orugas en el suelo. Además, el chingolo de Bachman se usa para indicar la salud de los bosques de pinos de hoja larga en el sureste de los Estados Unidos.



Fotografía por: [Andrew Cannizzaro](#)/Flickr

## Consejos de observación

Se puede ver al chingolo de Bachman cantando mientras está posado en ramas cercanas al suelo. Las exhibiciones de canto comienzan hasta dos meses antes de la temporada de reproducción, generalmente entre abril / mayo y julio / agosto. Por lo general, la hembra pondrá 2-3 crías por año que contienen 3-5 huevos. El chingolo de Bachman no vuela directamente hacia y desde su nido y, a menudo, camina cierta distancia antes de volar o aterrizar. El chingolo de Bachman construye su nido en el suelo. El nido generalmente está debajo de un arbusto, pasto o palma

enana y es una cúpula o copa abierta construida con hierbas finas y otra vegetación.


## Dato interesante

Solo la hembra incuba los huevos, y luego tanto el macho como la hembra cuidan y alimentan a las crías después de que nacen. Durante este tiempo, la hembra comenzará a construir un nuevo nido para su próxima cría.

## Hábitat ideal

El chingolo de Bachman prefiere rodales de pino maduro (> 80 años) de dosel arbóreo abierto (<50% de cobertura) con un sotobosque de sabana cubierta de hierba. Los chingolos son más abundantes en áreas con vegetación <3 pies/1 m y > 80% de cobertura herbácea con algunos parches de suelo desnudo para movimiento y escape. Además, los arbustos bajos (<30% de cobertura) proporcionan cobertura para anidar y posarse. Los incendios terrestres frecuentes de movimiento lento son esenciales para mantener una matriz de parches de hábitat adecuados de > 185 ac/75 ha de bosques maduros y más jóvenes con corredores para permitir el movimiento entre parches. Los sitios de anidación dentro de las áreas quemadas durante los 12 meses anteriores son muy favorables. Los chingolos de Bachman también utilizan áreas de tala recién plantadas y plantaciones de pinos jóvenes de pinos de hoja larga, pino taeda, pino de hoja corta, y pino ellioti donde los pastos nativos dominan la cobertura del suelo y se encuentran

perchas disponibles. Alternativamente, ocuparán campos abiertos relativamente herbáceos y sitios de praderas con extensos pastos o hierbas.



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Permita incendios naturales o realice de manera proactiva quemas prescritas cada tres años para reducir la cobertura del dosel arbóreo y los arbustos leñosos del sotobosque, y promover el crecimiento de pastos y malezas. Siempre que sea posible, proteja los sitios que actualmente albergan al chingolo de Bachman y restrinja la extracción de madera, excepto la que es necesaria para mantener el hábitat.

## Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la supresión de incendios naturales siempre que sea posible y la realización de incendios prescritos durante la temporada de anidación. Deben evitarse las prácticas agrícolas y el desarrollo que fomentan los monocultivos de pino, eliminan pastos, arbustos y otra vegetación del suelo. Los chingolos de Bachman tampoco se desarrollan bien en pequeños parches aislados de hábitat.

## Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

El pájaro carpintero de cabeza roja, el colorín azul y el chipe pinero se benefician de las prácticas de manejo forestal que mantienen abiertos los bosques de pinos de hoja larga con pastos. Además, otras especies de aves que viven en un hábitat de pino de hoja larga de la sabana se beneficiarán del manejo del chingolo de Bachman.

## Otros recursos

**Servicio de Pesca y Vida Silvestre:** [Chingolo de Bachman](#)

**Guía Audubon de aves de América del Norte:** [Chingolo de Bachman](#)

**NatureServe:** 2021. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web] Versión 7.1.

NatureServe, Arlington, Virginia. [Chingolo de Bachman](#)

**Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida:**

**Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU:** [Chingolo de Bachman](#)

**División de Manejo Estratégico de Recursos y División de Manejo de Incendios, Región Sudeste, Perfil de Especies de Manejo de Incendios,** [Chingolo de Bachman](#)