# Papamoscas o mosquero saucero

*Empidonax traillii*

## Identificación

El mosquero saucero es un papamoscas pequeño, pardusco-oliva, de aproximadamente 5,1 a 6,7 pulgadas/13 a 17 cm de largo. Tienen una cola y alas relativamente largas con dos barras blancas, un anillo ocular débil o ausente, una garganta blanca y un pecho de color oliva opaco a marrón. Hay cuatro subespecies reconocidas de papamoscas saucero; la subespecie del sudoeste está en peligro de extinción a nivel federal y es virtualmente indistinguible de otros papamoscas sauceros a simple vista.

Fotografía por: Andrew Weitzel/Flickr

## Consejos de observación

En la primavera y el verano, los mosqueros sauceros se pueden ver y escuchar en hábitats húmedos en todo Estados Unidos y partes de Canadá, a menudo posados en un sauce u otro arbusto. Tienden a llegar más tarde a los lugares de reproducción en comparación con los papamoscas similares, y la mejor manera de distinguir a los papamoscas durante la temporada de reproducción es por su canto. Escuche el canto ronco "*fitz-biu*" o la llamada "*huit*." La subespecie del sudoeste suena similar a otros papamoscas sauceros, pero por lo general tiene un canto más largo y de menor frecuencia, y se reproduce en el suroeste de los Estados Unidos. Los mosqueros sauceros generalmente son aves solitarias, incluso en sus áreas de invernada en América Central y del Sur.

## Dato interesante

Los mosqueros sauceros se parecen mucho a los mosqueros aileros (papamoscas aileros), que también se reproducen en hábitats húmedos y arbustivos más al norte. Las dos especies se identifican principalmente en el campo por sus diferentes cantos. Hasta 1973, estas dos aves se consideraban la misma especie, el papamoscas de Traill, el nombre científico del papamoscas saucero.

## Hábitat ideal

Los papamoscas sauceros se reproducen en una variedad de hábitats arbustivos (> 5% de cobertura de arbustos, a menudo especies de sauces) cerca de agua corriente o estancada en todo el oeste de EE. UU. y Canadá, incluidos prados de castores, a lo largo de bosques y en tierras bajas con matorrales, colinas y valles abiertos y parques de montaña. En el noroeste del Pacífico, también utilizan áreas de matorrales más áridas, bosques maduros, áreas verdes de álamo temblón, bosques cerca de tierras agrícolas y en áreas taladas de bosques tempranos de sucesión.  En el centro y este de los EE. UU., se reproducen tanto en humedales como

en áreas secas de tierras altas, como arroyos ribereños, praderas y bordes de bosques. Los mosqueros sauceros del suroeste se reproducen en comunidades de arbustos y bosques ribereños relativamente densos compuestas de vegetación nativa y exótica, como sauces, chilca, negundo, jazmin tallo, álamo, tamarisco y árbol de paraíso. Los papamoscas sauceros generalmente colocan nidos en sauces u otros arbustos y árboles cerca del suelo y dentro del perímetro del matorral de arbustos. Durante la migración, los papamoscas sauceros usan hábitats arbustivos húmedos similares con sauces, álamos y árboles de paraíso, y también usan campos de cultivo adyacentes.



*Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International*

## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Mantenga la vegetación ribereña (incluidos árboles y arbustos exóticos como tamariscos si no hay arbustos nativos disponibles) a lo largo de arroyos, ríos, estanques de castores, prados húmedos y otras fuentes de agua corriente o estancada. Minimice la perturbación de la vegetación ribereña durante la temporada de anidación (mayo-julio). Reduzca el impacto del pastoreo y el pisoteo de ganado en áreas ribereñas a través de cercas en las áreas ribereñas. El pastoreo rotacional beneficia a muchas especies ribereñas. Desaliente las poblaciones de tordos de cabeza café manteniendo el ganado disperso o en movimiento y descansando periódicamente las unidades de pastoreo durante al menos un año para permitir que las poblaciones locales de papamoscas sauceros del suroeste se desarrollen sin la presión de los tordos.

## Actividades de manejo que deben evitarse

Evite eliminar el hábitat ribereño, especialmente en el oeste de los EE. UU., mediante actividades como la canalización, la construcción de presas, el bombeo de agua subterránea, el desarrollo recreativo y el pastoreo intensivo de toda la temporada. Estas actividades han sido particularmente perjudiciales para el papamoscas saucero del suroeste. El pastoreo en áreas ribereñas también puede compactar el suelo y crear cárcavas, que pueden secar los prados húmedos y también pueden perturbar a los mosqueros que anidan. Evite el uso de pesticidas siempre que sea posible, ya que reducen el suministro de insectos para los mosqueros.

## Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los mosqueros sauceros son los castores, los mosqueros oscuros y los mosqueros alieros.

## Otros recursos

**BirdLife International y Manual de las aves del mundo.** 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. Mosquero saucero

**The Cornell Lab of Ornithology**, Aves del Mundo Papamoscas saucero

**The Cornell Lab of Ornithology**, Todo sobre las aves Mosqueros sauceros

**U.S. Fish and Wildlife Service**, Servicios Ecológicos de Arizona. 2014. Papamoscas sauceros del suroeste (*Empidonax traillii extimus*) Revisión quinquenal Phoenix, AZ. 104 págs.